

*...ЭТО было невыносимо...*

*Казалось все хорошее, что у меня было, ушло навсегда...*

*Я избегала любимого человека, не смея сказать ему  
отвратительную правду...*

*Тревога и одиночество заполняли все пространство ...*

*Это звучало как приговор: ГЕРПЕС...*

**... и тогда Доктор назначил мне Валтрекс:  
ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ – ГЕРПЕС УЖЕ НЕ УГРОЖАЕТ  
МОЕЙ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ**

**Решительно остановит герпес на любой стадии**



**Эффективность выше, а лечение короче**



**ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКОЕ  
СРЕДСТВО  
ПОСЛЕДНЕГО  
ПОКОЛЕНИЯ**

**Самый короткий курс лечения  
генитального герпеса:  
теперь всего 3 дня.**

**Просто как 1-2-3<sup>5</sup>:**

**1 таблетка,  
2 раза в день,  
В течение 3 дней.**

# Валтрекс обеспечивает быстрый, точный и мощный противогерпетический эффект, прерывая болезнь на той стадии, на которой начато лечение


## **Валтрекс – направленный противовирусный эффект**

Всего Одна молекула ацикловира разрушает вирус герпеса,...  
...но лишь одна из десяти молекул ацикловира достигает цели.

**Валтрекс** в 5 раз повышает точность противогерпетического эффекта<sup>1,2</sup>:  
**Цели достигает каждая вторая молекула!**

## **Валтрекс – мощный противогерпетический эффект.**

Мощный противогерпетический эффект – это создание концентраций препарата, подавляющих практически все активные вирусы герпеса.



Валтрекс обеспечивает концентрации, недостижимые для ацикловира: ацикловир тормозит активность вируса, Валтрекс блокирует вирус.

## **Валтрекс – быстрое и надежное решение проблемы**


- Одномоментно прерывает размножение вирусов,
- Блокирует поражение новых клеток,
- Ограничивает размер области поражения,
- В 1/3 случаев везикулы и эрозии вообще не развиваются, если лечение начато рано, когда пораженных клеток еще немного (в первые 6 часов после появления предвестников)<sup>4</sup>.

# Валтрекс относится беспощадно к вирусу и бережно к клеткам организма

**Валтрекс (валацикловир) – является специальной транспортной формой ацикловира, увеличивающей биодоступность препарата в 5 раз<sup>1</sup>:**

ВАЛТРЕКС = АЦИКЛОВИР + Аминокислота ВАЛИН.

Пройдя стенку кишечника валацикловир немедленно превращается в исходные компоненты: ацикловир и валин.




Ацикловир, образовавшийся в организме при диссоциации ВАЛТРЕКСА, нуждается в “активации”, которая происходит внутри клеток организма и заключается в последовательном присоединении к ацикловиру трех молекул фосфата<sup>6</sup>:

1). Присоединение первого фосфата способен осуществить лишь фермент, который имеет только вирус герпеса (вирусная тимидинкиназа).


2). Присоединение к ацикловиру 2 оставшихся фосфатов, осуществляют клеточные ферменты (киназы).

**Ацикловир не повреждает здоровые клетки организма, “активируясь” лишь в клетках, пораженных вирусом герпеса (в которых есть вирусная тимидинкиназа)<sup>6</sup>.**

Здоровая клетка:  
нет вируса герпеса –  
нет вирусной тимидинкиназы –  
ацикловир не “активируется”



Инфицированная вирусом герпеса клетка:  
вирус герпеса присутствует –  
вирусная тимидинкиназа присутствует  
ацикловир “активируется”



**Всего одна молекула ацикловира обрывает синтез ДНК вируса герпеса<sup>6</sup>.**

“Активированный» ацикловир, встраиваясь в ДНК вируса, обрывает дальнейшее ее удлинение (облигатная терминация цепи). Это происходит потому, что ацикловир не имеет участка, необходимого для присоединения следующих звеньев ДНК.

Из всех противогерпетических препаратов, только ацикловир является облигатным терминатором цепи ДНК.

# Валтрекс – эффективность выше, а лечение короче

## Схема терапии Валтрексом генитального герпеса:

Утро	500мг	500мг	500мг
Вечер	500мг	500мг	500мг
	1 день	2 день	3 день


### ● Валтрекс обеспечивает удобство:

Пациенту легко соблюдать режим лечения.

Уменьшается влияние “забывчивости” на результат терапии.

### ● Валтрекс:

- Укорачивает общую продолжительность заболевания<sup>4,5</sup>
- Продолжительность выраженной боли укорачивается в 1,5 - 2 раза<sup>4,5</sup>.
- Длительность выделения вируса уменьшается в 3 раза, быстро снижая риск инфицирования окружающих<sup>4,5</sup>.
- Чем раньше начато лечение генитального герпеса Валтрексом, тем вероятнее, что герпес вообще не разовьется<sup>4</sup>:



Промежуток между появлением "предвестников" герпеса и началом приема Валтрекса

Литература: 1. J.Soul-Lawton et al., Antimicrob.Agents Chemother, 1995; 39,12: 2759-64, 2. Spruance SL, et al. Antimicrob.Agents Chemother, 2003; 47,3: 1072-80, 3. Weller S. et al., Clin Pharmacol Ther, 1993; 54(6): 595-605, 4. Strand A, et al. Sex Transm Inf 2002;78:435-439, 5. Leone P.A et al., Clin Infect Dis, 2002; 34:958--62 6. Griffiths P., Optimizing the management of genital herpes. The Royal Society of medicine Press Ltd. 2000, pp.13-19

**Состав:** каждая таблетка Валтрекса содержит 500 мг валацикловира в виде гидрохлорида. Валтрекс является противовирусным средством. **Показания к применению:** Лечение инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных вирусом простого герпеса, включая впервые выявленный и рецидивирующий генитальный герпес. Валтрекс способен предупредить образование поражений, если его принять при появлении первых симптомов рецидива простого герпеса. **Противопоказания:** Валтрекс противопоказан больным с гиперчувствительностью к валацикловиру, ацикловиру и любому вспомогательному ингредиенту, входящему в состав препарата. **Способ применения:** при лечении инфекций, вызванных вирусом простого герпеса Валтрекс назначается в дозе 500 мг 2 раза в сутки. В случае рецидивов лечение должно продолжаться 3 или 5 дней. При рецидивах ВПГ идеальным считается назначение Валтрекса в продромальном периоде или сразу же после появления первых симптомов заболевания. Дозу Валтрекса рекомендуется уменьшать у пациентов со значительным снижением функции почек. **Побочные эффекты:** Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, дискомфорт в животе. Со стороны крови: редкие случаи тромбоцитопении. Со стороны кожи и реакции гиперчувствительности: различные высыпания на коже, включая крапивницу, проявления фоточувствительности, кожный зуд. Со стороны почек: редко нарушение функции почек. Со стороны печени: редко наблюдается обратимое нарушение функциональных печеночных тестов, которое иногда расценивают как проявления гепатита. Неврологические: головная боль, усталость. Форма выпуска: таблетки 500 мг, в упаковке 10 таблеток. Препарат отпускается по рецепту врача.