

# ФАМВИР®

фамциклоvir

## Сильнее, чем вирус



**✓ ФАМВИР –**  
современный препарат  
для терапии  
генитального герпеса

**✓ ФАМВИР –**  
снижает боль и зуд  
менее, чем за 2 дня

**✓ ФАМВИР –**  
при супрессивной терапии  
предотвращает  
рецидивы генитального  
герпеса у 71% пациентов  
на протяжении 12 месяцев



### ФАМВИР®/FAMVIR® КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Противовирусный препарат для системного применения

#### Состав и форма выпуска

Фамциклоvir.  
Таблетки 250 мг, в упаковке 21 шт.

#### Показания

Инфекция, вызванная *Varicella zoster* (опоясывающий лишай). Инфекция, вызванная *Herpes simplex* (тип I и II): первичная инфекция, обострение хронической инфекции, супрессия рецидивирующей инфекции.

#### Дозирование

Рекомендации по режиму дозирования зависят от показания (см. Инструкция по применению препарата / информация для специалиста/).

#### Противопоказания

Повышенная чувствительность к фамциклоvirу или любому из компонентов препарата.  
Повышенная чувствительность к пенциклоvirу.

#### Предостережения

Следует соблюдать осторожность при лечении больных с нарушением функции почек, для которых может потребоваться коррекция режима дозирования. При наличии клинических проявлений генитального герпеса (заболевания, передающегося половым путем) пациенты должны избегать половых контактов, даже в случае начала противовирусного лечения. Эффективность и безопасность Фамвира у детей не изучались, поэтому его применение у этой категории пациентов не рекомендуется. Применение в периоды беременности и лактации не рекомендуется, если только возможные преимущества лечения не превышают потенциальный риск.

#### Лекарственные взаимодействия

Клинически значимых фармакокинетических взаимодействий фамцикловира с другими препаратами не отмечалось. Воздействие фамцикловира на систему цитохрома P450 не выявлено. Пробеницид и лекарственные средства, оказывающие влияние на функцию почек, могут изменять уровень пенцикловира в плазме.

#### Побочное действие

Переносимость фамцикловира в исследованиях у человека была хорошей. С такой же частотой, как и у пациентов, получавших плацебо, отмечались слабые и умеренные головные боли и тошнота. В постмаркетинговых исследованиях редко отмечались рвота, головокружение, кожная сыпь и, преимущественно у пожилых пациентов, спутанность сознания и галлюцинации. У пациентов со сниженным иммунитетом отмечались также боли в животе, лихорадка и редко – гранулоцитопения и тромбоцитопения.

Полную информацию о препарате Фамвир можно получить в представительстве компании Новartis Фарма Сервисез Инк.:  
123104, москва, Б. Палашевский пер., 15  
Тел.: (7 095) 967 1270; факс: (7 095) 967 1268  
[www.novartis.ru](http://www.novartis.ru)