

VALTREX®

250 mg

Koostumus

Tabletti sisältää 250 mg valasikloviiria vaikuttavana aineena. Tablettien valmistukseen tarvittavina apuaineina on käytetty mikrokiteistä selluloosaa, krospovidonia, povidonia, magnesiumstearaattia, karnaubavahaa, kolloidista vedetöntä piioksidia, metyylihydroksipropyyliselluloosaa ja polyetyleeniglykolia, väriaineina titaanidioksidia (E171) ja kirkasta sinistä (E133). Tabletit ovat valkoisia, pitkänomaisia, pyöristettyjä (pituudeltaan 14,5 mm).

Miten lääke vaikuttaa?

Valtrex pysäyttää herpes simplex ja varicella zoster -viruksen lisääntymisen.

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Oy, PL 5, 02271 Espoo.

Valmistaja

The Wellcome Foundation Ltd., Temple Hill, Dartford, Kent, DA1 5AH, Englanti
tai

Glaxo Operations UK Ltd., Priory Street, Ware, Hertfordshire SG12 0DJ,
Englanti

tai

Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero,
Burgos, Espanja.

Käyttöaihe

Valtrex on lääke ihon ja limakalvojen herpes simplex -infektioiden hoitoon ja estohoitoon sekä vyöruusun hoitoon.

Huomatkaa, että lääkäri on voinut määrätä lääkettä muuhun käyttöaiheeseen tai muun annoksen kuin tässä pakkausselosteessa on mainittu. Noudattakaa aina lääkärin ohjeita ja pakkaukseen kiinnitettyä nimilippua.

Koska lääkettä ei tule ottaa?

Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä valasikloviirille, asikloviirille tai jollekin tablettien apuaineelle, ei tule ottaa Valtrexia.

Huomioitava ennen kuin otatte lääkettä sekä lääkehoidon aikana

Varsinkin vanhempien henkilöiden ja potilaiden, joiden munuaistoiminta on alentunut, on syytä nauttia runsaasti vettä lääkityksen aikana.

Raskaus

Kokemukset Valtrexin käytöstä raskauden aikana ovat vähäisiä. Kysykää ohjeita lääkäriltänne ennen kuin käytätte Valtrexia raskauden aikana.

Imetys

Imeytyy äidinmaitoon, joskin tällä ei liene vaikutusta imetettävään lapseen. Kysykää kuitenkin ohjeita hoitavalta lääkäriltänne.

Vältettävä lääkehoidon aikana

Joidenkin lääkkeiden samanaikainen käyttö Valtrexin kanssa voi vaikuttaa hoidon tuloksiin. Kysykää sen vuoksi ohjeita lääkäriltänne ennen kuin otatte samanaikaisesti muita lääkkeitä.

Annostusohjeet

Lääkäri määrää Valtrex-annoksen yksilöllisesti. Herpes simplex -infektioiden estohoitoon tavallinen annos on 500 mg kerran päivässä tai 250 mg kahdesti päivässä. Jos unohdatte ottaa jonkin annoksen, ottakaa se heti kun muistatte ja jatkakaa sitten tavallisen annostuksen mukaisesti.

Ruuan nauttiminen samanaikaisesti Valtrexin kanssa ei vaikuta Valtrexin tehoon. Kuten yleensäkin tabletit tulee nauttia noin 1/2 vesilasillisen kera.

Mitä tehdä, jos olette ottanut liian suuren annoksen?

Jos olette ottanut liian suuren annoksen lääkettä, ottakaa yhteys lääkäriin tai lähimpään sairaalaan.

Mitä haittavaikutuksia lääke voi aiheuttaa?

Tavallisia: Lievää päänsärkyä ja pahoinvointia on raportoitu. Harvinaisempia: Ihottumat (siis ei itse taudin aiheuttama). Jos saatte ihottumaa, ottakaa yhteys lääkettä määränneeseen lääkäriin mahdollisimman pian. Ottakaa myös yhteys lääkäriin, jos Teillä ilmenee odottamattomia oireita, koska nämä voivat olla merkki siitä, että lääke ei sovi Teille.

Säilytys ja viimeinen käyttöpäivä

Säilytettävä kuivassa ja suojassa suoralta auringonvalolta. Älkää käyttäkö pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Ei lasten ulottuville.

päivitys: 9.8.2001

© Glaxo Wellcome 2001

VALTREX

tabletter 250 mg

Vad innehåller läkemedlet?

Varje tablett innehåller valacyclovir 250 milligram som verksamt ämne. Som hjälpsubstanser (för att tillverka tablettarna) ingår mikrokristallin cellulosa, krosprovidon, povidon, magnesiumstearat, karnaubavax, kolloidal vattenfri kiseldioxid, metylhydroxipropylcellulosa och polyetylen glykol, färgämnen: titandioxid (E171) och briljantblått (E133). Till utseendet är tablettarna vita, avlånga (14,5 mm långa) och rundade.

Hur verkar läkemedlet?

Valtrex blockerar förökningen av herpes simplex och varicella/zoster -virus.

Innehavare av försäljningstillstånd

GlaxoSmithKline Oy, PB 5, 02271 Esbo.

Tillverkare

The Wellcome Foundation Ltd., Temple Hill, Dartford, Kent, DA1 5AH, England
eller

Glaxo Operations UK Ltd., Priory Street, Ware, Hertfordshire SG12 0DJ,
England

eller

Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero,
Burgos, Spanien.

Vad används läkemedlet för?

Valtrex är ett medel för behandling och suppression av infektioner i hud och slemhinnor orsakade av herpes simplex-virus samt mot bältros. Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i denna bipacksedel. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

När skall läkemedlet inte användas?

Valtrex bör inte användas av personer som är överkänsliga för valacyclovir eller någon annan av tablettarnas beståndsdelar.

Att tänka på innan och när läkemedlet används

Framförallt äldre personer bör dricka mycket vatten under behandlingen. Hos personer med starkt nedsatt njurfunktion bör behandling med Valtrex genomföras med lägre dos.

Graviditet

Erfarenheterna från behandling med Valtrex under graviditet är begränsade. Rådgör därför med läkare före behandling med Valtrex under graviditet.

Amning

Uppgifter saknas huruvida valacyclovir går över i modersmjölk. Acyclovir går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare före användning av Valtrex under amning.

Vad skall Du undvika när du använder detta läkemedel?

Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Rådgör därför med Din läkare före samtidig användning.

Doseringsanvisning

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig. Vanlig dos för vuxna för suppression av herpes simplex infektioner är 500 mg en gång eller 250 mg två gånger om dagen.

Om man glömmer att ta en dos bör man ta den så snart man kommer ihåg det och därefter fortsätta att ta doserna efter det ursprungliga schemat. Effekten av Valtrex påverkas inte av samtidigt födointag, men som vanligt vid tablettmedicinering bör man svälja dem med ca 1/2 glas vatten.

Vad skall man göra om man tagit för stor dos?

Om du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare eller sjukhus.

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

Vanliga: Lätt huvudvärk och illamående har rapporterats. Mindre vanliga: Hudutslag, andra än de som orsakas av själva sjukdomen. Om hudutslag skulle uppkomma bör Du snarast kontakta läkaren som ordinerat behandlingen eftersom detta kan vara täcken på att läkemedlet inte passar Dig.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras torrt, i rumstemperatur och i skydd för direkt solljus. Använd inte efter utgångsdatum som finns på förpackningen. Förvaras oåtkomligt för barn.

Informationen senast reviderad

9.8.2001